

内科レジメン

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間(日) |
|--|---|--|--|--|----------|
| Rituximab療法(初回：25mL/h) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 25→50→100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| Rituximab療法(2回目以降：50mL/h) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 50→100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| Rituximab療法(2回目以降：100mL/h) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| R-THP-COP療法(初回：25mL/h) | リツキサン テラルピシン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 25→50→100→200mL/hで漸増 30分 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day2 day1~5 | 21 |
| R-THP-COP療法(2回目以降：50mL/h) | リツキサン テラルピシン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 50→100→200mL/hで漸増 30分 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day2 day1~5 | 21 |
| R-THP-COP療法(2回目以降：100mL/h) | リツキサン テラルピシン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 100→200mL/hで漸増 30分 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day2 day1~5 | 21 |
| R-CVP療法(初回：25mL/h) | リツキサン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 25→50→100→200mL/hで漸増 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day1~5 | 21 |
| R-CVP療法(2回目以降：50mL/h) | リツキサン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 50→100→200mL/hで漸増 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day1~5 | 21 |
| R-CVP療法(2回目以降：100mL/h) | リツキサン エンドキサン オンコピン ブレドニゾロン | 375mg/m ² 750mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 100→200mL/hで漸増 180分 30分 点滴静注 or 内服 | day1 day2 day2 day1~5 | 21 |
| エンドキサンパルス療法 | エンドキサン | 750mg/body | 180分 | day1 | 28 |
| Bendamustine療法 | トレアキシン | 120mg/m ² | 60分 | day1.2 | 21 |