

腎・膠原病センター レジメン

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | コースの期間(日) |
|--|--------|----------------------|--|------|-----------|
| エンドキサンパルス療法 (IVCY) | エンドキサン | 750mg/body | 180分 | day1 | 28 |
| エンドキサンパルス療法(biweekly IVCY) | エンドキサン | 500mg/body | 180分 | day1 | 14 |
| Rituximab療法(初回：25mL/h) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 25→50→100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| Rituximab療法(2回目以降：50mL/h開始) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 50→100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| Rituximab療法(2回目以降：100mL/h開始) | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | コースの期間(日) |
|---|--------|----------------------|--|------|-----------|
| Rituximab・成人ネフローゼ(初回)療法 | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 25→50→100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| Rituximab・成人ネフローゼ(2回以降)療法 | リツキサン | 375mg/m ² | 【投与速度：1時間毎に漸増】 100→200mL/hで漸増 | day1 | 7 |
| I V C Y療法 | エンドキサン | 500mg/body | 120分 | day1 | 28 |